

RELACIÓN DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS – Formas Sólidas

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Abacavir comprimido (<i>Kivexa, Triumeq, Trizivir</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE C | 2 |
| Abacavir comprimido (<i>Ziagen</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE C | 2 |
| Abiraterona comprimido (<i>Zytiga</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |
| Acenocumarol comprimido (<i>Sintrom</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE D S | Similitud |
| Ácido Valproico comprimido (<i>Depakine, Depakine Crono</i>) | Comprimido gastroresistente | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 3 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Acitretina cápsula (<i>Acitretina EFG,</i> <i>Neotigason</i>) | Cápsula | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Afatinib comprimido (<i>Giotrif</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |
| Alitretinoína cápsula (<i>Toctino</i>) | Cápsula blanda | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple. | FDA RE D | 3 |
| Altretamina cápsula (<i>Hexalen ME</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Ambrisentan comprimido (<i>Volibris</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Anastrozol comprimido (<i>Amenur, Arimidex,</i> <i>Anastrozol EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Axitinib comprimido (<i>Inlyta</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |
| Azatioprina comprimido (<i>Imurel</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | IARC 1; FDA RE D | 2 |
| Bexaroteno cápsula (<i>Targretin</i>) | Cápsula blanda | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación | FDA RE X | 1 |
| Bicalutamida comprimido (<i>Casodex, Bicalutamida EFG, Pencial, Probic, Saveprost, Wibical</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |
| Bosentan comprimido (<i>Bosentan EFG, Stayveer, Tracleer</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Bosutinib comprimido (<i>Bosulif</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cabergolina comprimido (<i>Cabergolina EFG, Dostinex, Sogilen</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE B | 3 |
| Cabozantinib cápsula (<i>Cometriq</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | Borrador 2016 |
| Capecitabina comprimido (<i>Capecitabina EFG, Xeloda, Ecansya, Xelcip, Zapecine</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Carbamazepina comprimido (<i>Carbamacepina ECG, Tegretol</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE D | 2 |
| Ciclofosfamida gragea (<i>Genoxal</i>) | Gragea | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | IARC 1; FDA RE D | 1 |
| Ciclosporina cápsula (<i>Ciqorin, Sandimmun Neoral</i>) | Cápsula blanda | No precisa preparación | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | IARC 1; FDA RE C | 2 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|---------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Clomifeno comprimido (<i>Omifin</i>) | Comprimidos | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 Borrador 2016 |
| Clonazepam comprimido (<i>Rivotril</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 3 |
| Clorambucilo comprimido (<i>Leukeran</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 1; FDA RE D | 1 |
| Colchicina comprimido (<i>Colchicina EFG, Colchimax</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 |
| Crizotinib cápsula (<i>Xalcori</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Dabrafenib cápsula (<i>Tafinlar</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |
| Dasatinib comprimido (<i>Sprycel</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Deferiprona comprimido (<i>Ferriprox</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 2 |
| DietilEstilbestrol/DES tableta (<i>Dimeprost ME</i>) | Tableta | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 1; FDA RE X | 2 |
| Dinoprostona comprimido (<i>Prostaglandina E2 EFG</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 |
| Efavirenz comprimido (<i>Atripla, Efavirenz EFG, Stocrin, Sustiva</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE D | 3 Borrador 2016 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Efavirenz cápsula (<i>Sustiva</i>) | Cápsula | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE D | 3 Borrador 2016 |
| Entecavir comprimido (<i>Baraclude</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE C | 2 |
| Enzalutamida cápsula (<i>Xtandi</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 Borrador 2016 |
| Erlotinib comprimido (<i>Tarceva</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Eslicarbazepina comprimido (<i>Zebinix</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 Borrador 2016 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Espironolactona comprimido (<i>Aldactacine, Aldoleo</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE C | 2 |
| Espironolactona comprimido (<i>Aldactone, Espionolactona EFG</i>) | Comprimido recubierto | | | | |
| Estradiol comprimido (<i>Activelle Angeliq, Climen, Climodien, Duofemme, Eviana, Meriembra, Mevaren, Perifem, Progyluton, Progynova, Qlaira, Trisequens, Zoely</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Estramustina cápsula (<i>Estracyt</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |
| Estrogenos conjugados comprimido (<i>Equin</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación | FDA RE X | 2 |
| Estrógenos/ progesterona comprimido (Múltiples Especialidades) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 1; FDA RE X | 2 |
| Etoposido cápsula (<i>Vepesid</i>) | Cápsula blanda | No precisa preparación | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | IARC 1; FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Everolimus comprimido (<i>Afinitor, Certican, Votubia</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Exemestano comprimido (<i>Aromasil, Exemetano EFG, Gepex</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |
| Fenitoína cápsula (<i>Epanutin</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | IARC 2B; FDA RE D | 2 |
| Fenitoína comprimido (<i>Sinergina</i>) | Comprimido | | | | |
| Fenoxibenzamina cápsula (<i>Dibenyline ME</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2B; FDA RE C | 2 |
| Finasterida comprimido (<i>Alocare, Arahormo, Celganol, Finasterida EFG, Lambdaxel, Litace, Maxpil, Normomale, Propecia, Proscar</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Fingolimod cápsula (<i>Gilenya</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE C | 2 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|---------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Fluconazol cápsula (<i>Candifix, Diflucan, Fluconazol EFG, Lavisa, Loitin</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE C | 3 |
| Fludarabina comprimido (<i>Beneflur</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Fluoximesterona comprimido (<i>Halotestin ME</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Flutamida comprimido (<i>Flutamida EFG, Grisetin, Prostacur</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Gefitinib comprimido (<i>Iressa</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | | Ficha Técnica |
| Hidroxycarbamida/ Hidroxiurea cápsula (<i>Hydrea</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral | FDA RE D | 1 |
| Hidroxycarbamida/ Hidroxiurea comprimido (<i>Syklos</i>) | Comprimido | | | | Fórmula Magistral. |
| Imatinib comprimido (<i>Glivec</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Leflunomida comprimido (<i>Arava; Lefluartir, Leflunomida EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Leflunomida comprimido (<i>Arava; Lefluartir, Leflunomida EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Lenalidomina cápsula (<i>Revlimid</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Letrozol comprimido (<i>Devazol, Femara, Galdar, Letrozol EFG, Loxifan</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |
| Lomustina cápsula (<i>CeeNU ME, Lomustine EFG ME</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2A; FDA RE D | 1 |
| Macitentan comprimido (<i>Opsumit</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 Borrador 2016 |
| Medroxiprogesterona comprimido (<i>Farlutal, Perifem, Progevera</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2B; FDA RE X | 2 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Megestrol comprimido (<i>Borea, Maygace, Megefren</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE X | 1 |
| Melfalán comprimido (<i>Alkeran ME</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | IARC 1; FDA RE D | 1 |
| Mercaptopurina comprimido (<i>Mercaptopurina</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 1 |
| Metimazol comprimido (<i>Tirodril</i>) | Comprimidos | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 3 Borrador 2016 |
| Metotrexato comprimido (<i>Metrotexato EFG</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 |
| Micofenolato de mofetilo cápsula (<i>Cellcep, Micofenolato de mofetilo, Myfenax</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 2 |
| Micofenolato de mofetilo comprimido (<i>Cellcep, Micofenolato de mofetilo, Myfenax</i>) | Comprimido recubierto | | | | |
| Micofenolato sodico comprimido (<i>Myfortic</i>) | Comprimido gastroresistente | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 2 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Mifepristona comprimido (<i>Mifegyne</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Misoprostol comprimido (<i>Artrotec</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Misoprostol comprimido (<i>Cytotec</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Mitotano comprimido (<i>Lysodren</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Nevirapina comprimido (<i>Viramune</i>) | Comprimido gastroresistente | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE B | 2 |
| Nevirapina comprimido (<i>Viramune, Nevirapina EFG</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE B | 2 |
| Nilotinib cápsula (<i>Tasigna</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Nintedanib cápsula (<i>Vargatef</i>) | Cápsulas blandas | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. | | Ficha Técnica |
| Olaparib cápsula (<i>Lynparza</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | | Ficha Técnica |
| Ospemifeno comprimido (<i>Senshio</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 3 Borrador 2016 |
| Oxcarbazepina comprimido (<i>Oxcarbazepina EFG, Trileptal</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE C | 2 |
| Oxcarbazepina comprimido (<i>Oxcarbazepina EFG</i>) | Comprimido | | | | |
| Paliperidona comprimido (<i>Invega</i>) | Comprimidos liberación retardada | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE C | 3 Borrador 2016 |
| Panobinostat cápsula (<i>Farydak</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | | 1 Borrador 2016 |
| Paroxetina comprimido (<i>Arapaxel, Daparox, Frosinor, Motivan, Paroxetina EFG, Seroxat, Xetin</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 3 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Pazopanib comprimido (<i>Votrient</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Peramppanel comprimido (<i>Fycompa</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 Borrador 2016 |
| Pipobroman comprimido (<i>Vercyte ME</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 2 |
| Pomalidomide cápsula (<i>Imnovid</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 1 Borrador 2016 |
| Ponatinib comprimido (<i>Iclusig</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |
| Procarbazina cápsula (<i>Natulan</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2A; FDA RE D | 1 |
| Progesterona (Múltiples especialidades) | Varias formas | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2B | 2 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|-----------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Progestina (Múltiples especialidades) | Varias formas | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Propiltiouracilo tableta (<i>Propylthiouracil ME</i>) | Tableta | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2B; FDA RE D | 2 |
| Raloxifeno comprimido (<i>Evista, Optruma, Raloxifeno EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Rasagilina comprimido (<i>Altina, Azilect, Neuromiol, Raglysa, Rasagilina EFG</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE C | 2 |
| Regorafenib comprimido (<i>Stivarga</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |
| Ribavirina cápsula (<i>Rebetol, Ribavirina EFG</i>) | Cápsula | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Ribavirina comprimido (<i>Copegus, Ribavirina EFG</i>) | Comprimido recubierto | | | | |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Riociguat comprimido (<i>Adempas</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 Borrador 2016 |
| Risperidona comprimido (<i>Arketin, Calmapride, Diaforin, Risperdal, Risperidona EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar comprimido bucodispersable o suspensión oral. | FDA RE C | 2 |
| Risperidona comprimido (<i>Ryspemylan Flas, Risperdal Flas</i>) | Comprimido bucodispersable | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. | FDA RE C | 2 |
| Sirolimus comprimido (<i>Rapamune</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE C | 2 |
| Sorafenib comprimido (<i>Nevaxar</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Sunitinib cápsula (<i>Sutent</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tacrolimus cápsula (<i>Adoport</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE C | 2 |
| Tacrolimus cápsula (<i>Advagraf</i>) | Cápsula dura liberación prolongada | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. | FDA RE C | 2 |
| Tacrolimus comprimido (<i>Envarsus</i>) | Comprimido liberación prolongada | | | | |
| Tacrolimus cápsula (<i>Prograf, Tacni</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE C | 2 |
| Talidomida comprimido (<i>Talidomida ME</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE X | 2 |
| Tamoxifeno comprimido (<i>Nolvadex, Tamoxifeno EFG</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 1; FDA RE D | 1 |
| Tegafur cápsula (<i>Utefos</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | | Ficha Técnica |
| Temozolomida cápsula (<i>Temodal, Temozolomida EFG</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Teriflunomida comprimido (<i>Aubagio</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 Borrador 2016 |
| Tioguanina comprimido (<i>Tioguanina ME</i>) | Comprimido | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE D | 1 |
| Topiramato comprimido (<i>Acomicil, Fagodol, Topamax, Topibrain, Topiramato EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral. | FDA RE D | 3 |
| Topiramato cápsula (<i>Topamax Dispersable</i>) | Cápsula dispersable | | | | |
| Topotecan cápsula (<i>Hycamtin</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Toremifeno comprimido (<i>Fareston ME</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Trametinib comprimido (<i>Mekinist</i>) | Comprimido | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 Borrador 2016 |
| Tretinoína cápsula (<i>Vesanoid</i>) | Cápsula | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Ulipristal comprimido (<i>Ellaone, Esmya</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE X | 3 |
| Valganciclovir comprimido (<i>Valcyte, Valganciclovir EFG</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE C | 2 |
| Vandetanib comprimido (<i>Caprelsa</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Vemurafenib comprimido (<i>Zelvoraf</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | FDA RE D | 1 |
| Vigabatrina comprimido (<i>Sabrillex</i>) | Comprimido recubierto | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 |
| Vinorelbina cápsula (<i>Navelbine</i>) | Cápsula blanda | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. | FDA RE D | 1 |
| Vismodegib cápsula (<i>Erivedge</i>) | Cápsula | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | | 1 Borrador 2016 |
| Voriconazol comprimido (<i>Vfend</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | FDA RE D | 3 |

| Medicamento Forma farmacéutica (Especialidades) | Presentación | Recomendaciones de preparación | Recomendaciones de administración | FDA RE; Categoría IARC | Lista NIOSCH/ Motivo |
|---|--------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Warfarina comprimido (<i>Aldocumar</i>) | Comprimido | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE D | 3 |
| Zidovudina comprimido (<i>Combivir, Lamivudina- Zidovudina EFG, Trizivir</i>) | Comprimido recubierto | No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. | Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación. | IARC 2B; FDA RE C | 2 |
| Zidovudina cápsula (<i>Retrovir, Zidovudina EFG</i>) | Cápsula | No precisa preparación. | Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral. | IARC 2B; FDA RE C | 2 |
| Ziprasidona cápsula (<i>Zeldox, Zipraxidona EFG, Zypsilan</i>) | Cápsula | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 |
| Zonisamida cápsula (<i>Zonegan, Zonisamida EFG</i>) | Cápsula | No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. | Sólo afecta en personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. | FDA RE C | 3 |

Nomenclatura

AE: Aislador Estéril de presión negativa.

CSB I: Cabina de Seguridad Biológica clase I. CSB IIb:

Cabina de Seguridad Biológica clase IIb.

EFG: Especialidad Farmacéutica Genérica.

FDA RE: Categoría de la Food and Drug Administration de Riesgo en el Embarazo

IARC: Clasificación de Riesgo Carcinogénico en humanos según International Agency for Research on Cancer.

ME: Medicamento Extranjero.

SCTM: Sistema Cerrado de Transferencia de Medicamentos.

SPRL: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.